



## Instrucción: La Colonoscopia Preparación

### La Fecha del Procedimiento:

**Tiempo:** (¡Importante! Los pacientes deben llegar 30 minutos antes de el examen.)

**A Médica:**

**Número de teléfono:** (847) 247-0187

**El Lugar:** **Winchester Endoscopy, LLC**  
1870 W. Winchester Road Ste 146  
Libertyville, IL 60048

**POR FAVOR, NADA DE COMER O NI BEBAR DESPUES DE LA  
MEDIANOCHE**

Su appointment ha sido planificado para una colonoscopia. La colonoscopia permite al medico examinar el recubrimiento del colon ( intestine grueso ) para descartar anormalidades. El procedimiento se lleva a cabo instertando en el ano un tube flexible del grosio de un dedo y haciendoio avanzar hasta llegar al recto y al colon.

### Miralax y Gatorade Preparacion de colonoscopia:

- 2 DULCOLAX tabletas
- 1 botella MIRALAX de 238 gramos
- 1 botella de GATORADE de 64oz (limon y naranja)

Lea estas instrucciones con cuidado por lo menos una semana antes de su examen. Para mas informacion sobre los beneficios y riesgos de colonoscopia, se refiere por favor al folleto de information dado a usted en su appointment o por favor llame a la oficina para mas informacion.

**Por favor de consultar con su Cariologo, si usted tiene una condicion cardiaco de la sigulente relacina a su salud actual:**

- Es tratado actualmente para una condición cardiaca.
- Tiene un stent cardiaco y toma una medicina de prescripción.
- Si toma actualmente cualquiera "diluyentes de sangre"; como Aspirina, Plavix, Coumadin o Lovenox.
- Tiene un marcapasos o defibulator permiten,por favor notfic nestra oficina inmediatamente.

### Instruction de medicamentos:

#### Cinco días antes del procedimiento:

1. Pare medicinas que toma listaron abajo:
  - Coumadin (warfarin)
  - Plavix (clopidogrel)
  - Pradaxa
  - Lovenox

#### Tres días antes del procedimiento:

1. Evite comer, las semillas, las palomitas de maíz, las uvas, los guisantes, los frijoles y los tomates.

### Pacientes Cardiacos

Si es tratado para la hipertensión/hipotensión, continúe tomar su medicina como dirigido. En el día del procedimiento toma la medicina con SOLO un pequeña cantidad de agua.

### Pacientes Diabéticos

Si toma un oral hipoglucémico ("píldora de azúcar"), no le toma el día de su procedimiento. Si toma insulina, toma por favor 1/2 de su dosis de la mañana prescrita de insulina, el día de su procedimiento. Llame su fenciclidina si tiene cualquier pregunta acerca de su medicina durante su período de preparación.

### Información General

1. Debe llegar una hora antes de la cita planificada o como instruido. Su estancia entera para el procedimiento estará acerca de una hora y media.
2. Usted no es permitido coger un taxi ni casa de transporte público después del procedimiento. Un amigo o el pariente deberán conducirlo en casa, y alguien deberá estar con usted para por lo menos dos horas de asegurarse de que no hay problemas de la sedación o el procedimiento.
3. Después del procedimiento, no conduce un coche para el resto del día y no hace ninguna decisión importante hasta el día siguiente.
4. Los resultados de la biopsia están generalmente disponibles dentro de cinco días de negocios .
5. **Los pacientes con marcapasos** deben informar nuestra oficina al reservar esta cita..
6. **Los pacientes con desfibriladores internos** deben tener el procedimiento en Condell Medical Center.

**El Lugar:** NSG – Endoscopy Department

**La Fecha del Procedimiento:**

**Tiempo:**

### El día antes del procedimiento:

Comience una dieta de líquidos claros por la mañana y continúe todo el día complete. Los líquidos claros incluyen café, te, Gatorade ,Propel, Aqua, Jugo de manzana, uva blanca, cranberry blanco, jugos de frutas, caldo, y gelatina. **Por favor no tome NADA ROJO O VIOLETA, nada con ALCOHOL Y nada con leche** .Por favor no comas ninguno de alimentos solidos mientras el día entero

### La Preparación del intestinos:



1

En 3 P. M. tome dos (2) tabletas de DULCOLAX con un vaso de 8 oz de agua.



2

Approximadamente a las 5:00pm mezcla la botella de MIRALAX con el GATORADE. Agitar la solution hasta el MIRALAX se disuelve.



3

Tome un vaso de 8 onzas del líquido cada 10 o 15 minutos. **POR FAVOR TOMA LA SOLUCION COMPLETA.**



4

Los intestinos deben vaciar finalmente un líquido amarillo claro. Si por 7 de la mañana el movimiento del intestino todavía no es claro, llama por favor a su médico en (847) 247-0187.

**¡IMPORTANTE! POR FAVOR NADA DE COMER O NI BEBAR DESPUES DE LA MEDIANOCHE**

**Llame por favor nuestra oficina (847) 247-0187 con preguntas.**

